

## SELLO POSTAL CONMEMORATIVO

"Aves del Perú"

Tiraje	: 233,332 sellos postales (58,333 minipliegos)
Valor	: S/.6.00, S/.6.00, S/.6.00, S/.6.00,
Diseño	: Christian Alvarez M. - SERPOST S.A.
Pliego	: Minipliego de 04 sellos postales
Dimensiones	: 30 mm x 40 mm
Dentado	: 13 1/2
Color	: Policromía
Impresión	: Offset
Impreso en	: Thomas Greg and Sons - Perú

### OTRAS ESPECIES FILATELICAS

Sobres de Primer Día (SPD) : S/. 25.00

### DIA DE EMISION - BOLETIN 2009

09 de Noviembre de 2009




Matasellos de Primer  
Día de Emisión

**Serpost**  
El Correo del Perú

EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Distribución gratuita.



# Aves del Perú

**Serpost**  
El Correo del Perú

## **PLAYERO MANCHADO**

**(Actitis macularia)**

El playero manchado o andarríos maculado (*Actitis macularia*) es una pequeña ave limícola, de 18-20 cm de largo. Junto con su especie hermana, el *Actitis hypoleucos* forman el género *Actitis*. Viven en áreas geográficamente aisladas, y pueden hibridizarse. Su hábitat de cría es cerca de agua dulce. El Playero Manchado habita desde Norteamérica hasta Chile, y Perú, no son gregarias. Esta ave tiene una postura horizontal, patas cortas amarillentas, y pico naranja con un punto negro, robusto de 2 tonos. El color de su plumaje es pardo verdoso en el dorso, con la parte inferior clara, que se vuelve muy manchada durante el verano; las hembras tienen manchas más grandes y más negras.

## **PACA PACA**

**(Glaucidium brasilianum)**

De hábitos nocturnos y mirada impactante, esta pequeña lechuza de aprox 17 cm, es propia de lugares arbolados, como campos de cultivo, jardines o parques de todo el país, salvo en las zonas andinas de mayor altitud. Su vientre blanco presenta rayas de color pardo y el resto de su plumaje es parduzco con manchas y líneas blancas. Tiene ojos muy grandes y redondos, patas gruesas y pico pequeño, todos ellos de color amarillo, y posee un canto característico similar a un "pac-pac-pac" que dio origen a su nombre. La Paca Paca habita desde Norteamérica hasta Chile, Argentina y Perú. Orden: Strigiformes - Familia: Strigidae

## **ZARAPITO TRINADOR**

**(Numenius phaeopus)**

El Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*) habita en todos los continentes excepto Antártica. Anida al norte del hemisferio Norte. Inverna en el hemisferio Norte, América del Sur, frica, Australia, Nueva Zelanda y otras islas de Oceanía. Habita en la tundra durante la anidación, se le ve en costas

rocosas, costas fangosas, playas, estuarios, marismas, campos inundados y pastizales.

En el 2000 se le estimó una población en América del Sur de 57,000 ejemplares.

Se mantiene en pequeños grupos. Se incorporan en grupos más grandes para dormir.

De longitud logra de 36 a 46 cm, incluyendo el pico que puede medir de 6 a 9 cm. Las alas tienen una extensión de 78 a 88 cm. El peso es de unos 450 gramos. Las patas son largas. El pico es largo, de 5.4 a 9.9 cm, y curvado hacia abajo.

La temporada de cría es de mayo a agosto. La nidada usual es de tres a cuatro huevos, pueden ser de dos a cinco. La incubación toma de 27 a 28 días, los pichones son independientes de los 35 a 40 días.

Se alimenta de pequeños animalitos que obtiene en el suelo o ligeramente insertando el pico en el suelo.

En la temporada que no es de anidación algunos individuos defienden (de otros miembros de la misma especie) el área o territorio donde encuentran su sustento; durante esta temporada buscan su alimento durante la noche.

Al Zarapito Trinador también se le llama "Playero Trinador", "Zarapico Pico Cimitarra Chico", "Zarapito" y "Zarapito Cabecirrayado".

## **GARZA AZUL**

**(Egretta caerulea)**

Es una ave propia de humedales costeros y selváticos, y también suele visitar manglares y zonas pantanosas, pues en esos lugares halla su alimento, que está constituido por invertebrados acuáticos. La Garza Azul mide unos 56 cm, tiene el plumaje de dicho color, excepto en su cuello y cabeza que son de color morado. Acostumbra estar sola, aunque a veces forma grupos de dos a tres ejemplares, y anida en árboles, donde forma colonias de variable dimensión. Esta ave habita zonas desde el sur de Norteamérica hasta Uruguay, Argentina y Perú, siendo protegida por el Estado Peruano en algunas áreas de conservación.

Orden: Ciconiiformes - Familia: Ardeidae